

# AMIDALA

kiváló termés hozam, prémium malátázási paraméterek



## Előnyök:

- a sörárpa-termesztés és a söripar szempontjából preferált csúcskategóriás fajtajelleg és minőség
- levélkárosító gombákkal szemben nagyon nagy ellenálló képesség
- értékes agronómiai adottságok, kimagasló jövedelem termelőképesség

## Fajtajellemzők:

Az AMIDALA termesztése kiváló söripari árualap előállítását biztosítja hazai és régiós szinten egyaránt. Az új fajta hozama, termés- és söripari minőség stabilitása továbbá agronómiai adottságainak összessége egyértelműen hozzájárul a célpiacra történő hatékony és jövedelmező termesztéshez. A malátagyártás meghatározó fajtájaként a köztermesztésben dinamikus növekszik vetésterülete.

Az AMIDALA napjaink legújabb és legkorszerűbb valódi sörárpája, az erre a piacra szerveződő integrációk elismert és felismert szereplője. Biztonságosan és nagy évjárat stabilitás mellett termesztethető: kiváló fagyűrő képesség, alacsony dőlési hajlam, szártöréstől és kalásztöréstől mentes adottságok jellemzik.

Egészséges, levélkárosító gombákkal szemben nagyon nagy ellenálló képességgel rendelkezik: így alacsony növényvédőszer felhasználással, költséghatékony, eredményes és fenntartható gazdálkodást biztosít.

Vetésre a február végi időszak, továbbá a március hónap, de azon belül is a hónap első két dekádja tekinthető a legmegfelelőbbnek. A vetés naptári időpontja országrészenként és talajtípusonként eltérő lehet. Vetését jó vetőágy esetén kötöttebb talajon 2-3 cm, lazább talajon és ha a magágy készítés kifogásolható, a 3-5 cm-es mélységben javasoljuk elvégezni.

Vetőmagból optimális körülmények között elegendő 3,8-4,0 millió db csíra/ha elvetése (190-210 kg/ha). Száraz vetőágy „megkészt” vetésidő vagy nehéz vetési körülmények esetén növelni indokolt a normát 4,0-4,5 millió db csíra/ha-ra a magszámot (210-230 kg/ha).

Sörárpában a gyomirtás során lehetőleg kerüljük a hormonhatású készítményeket, mert az a söripari minőség alakulására kedvezőtlenül hathat. Gombakártétellel szemben lépünk fel preventíven. Hajlamosító tényezőket értékelve legyünk figyelmesek a levélszáritó betegségek kezelésére.

Kártevői közül a vetésfehérítő (veresnyakú árpabogár), és a gabonaszipolyok a legveszélyesebbek, melyek imágóinak megjelenését követően rövid időn belül javasolt az állománykezelések elvégzése.

# AMIDALA

kiváló termés hozam, prémium malátázási paraméterek

## Termesztési jellemzők:

|                 |  |
|-----------------|--|
| szemtermés      |  |
| fehérjetartalom |  |
| osztályozottság |  |
| HL-súly         |  |

## Technológiai jellemzők:

|                     |                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| javasolt vetésideő  | Február vége - március első két dekádja, talajtípustól függően azonban eltérő lehet. Köttettebb talajon 2-3 cm, lazább talajon 3-5 cm mélységben javasolt a vetés. |
| javasolt vetésnorma | Optimális körülmények között 3,8-4,0 millió csíra/ha, megkésített vagy nehéz vetési körülmények esetén 4,0-4,5 millió csíra/ha.                                    |

## Növekedési jellemzők:

|                      |  |
|----------------------|--|
| állománysűrűség      |  |
| magszám kalászonként |  |
| ezer magtömeg        |  |
| kalászosulás ideje   |  |
| érés ideje           |  |
| növekedési magasság  |  |
| állóképesség         |  |

## Betegség-ellenállóság:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| lisztharmat              |  |
| hálózatos levélfoltosság |  |
| levélrozsda              |  |

©  
Németország  
(BSA),  
Patentregistrierung  
©  
Erlebeke  
Nemzetközi  
17-  
18-  
tavaszi  
sörárpa  
2019.

# AMIDALA

kiváló termés hozam, prémium malátázási paraméterek

**Tavaszi sörárpa fajták árumag minősége => AMIDALA aszályos évjáratokban is egyedülállóan jó és stabil árumag adottságokkal**

**AMIDALA tavaszi sörárpa árumag minősége => AMIDALA aszályos évjáratokban is egyedülállóan jó és stabil árumag adottságokkal**

AMIDALA  
kísérletek  
helyszínek  
Árumag  
minőségi  
vizsgálatok  
(2019-  
2020.  
évek)

©  
NÉBIH  
-  
GÉV-  
kivonat

# AMIDALA

kiváló terméshozam, prémium malátázási paraméterek

**AMIDALA termőképessége a fajtaregisztrációs kísérletekben**

2020  
és  
2021.